
TENTAMEN MEDICUM
INAUGURALE,

DE

APOPLEXIA.

2

TENTAMEN MEDICUM

INAUGURALE,

DE

APOPLEXIA,

QUOD,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Autoritate Reverendi admodum Viri,

D. GEORGII BAIRD, S.S. T.P.

ACADEMIAE EDINBURGENAE PRAEFECTI.

NECNON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI Consensu,

Et Nobilissimae FACULTATIS MEDICAE Decreto;

PROGRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

ALEXANDER MELVILLE,

SCOTUS;

SOC. REG. PHYS. EDIN. SOC.

AD DIEM 12 SEPTEMBRIS, HORA LOCOQUE SOLITIS.

EDINBURGI,

CUM PRIVILEGIO,

APUD ROBERTUM ALLAN.

MDCCXCVII.

PATRI OPTIMO,

ANDREÆ MELVILLE,

DE

HALLFIELD, ARMIGERO,

HAS

STUDIORUM PRIMITIAS,

CONSECRAT

FILIUS.



Digitized by the Internet Archive
in 2020 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b31966512_0001

TENTAMEN MEDICUM

INAUGURALE,

D E

APOPLEXIA.

AUCTORE, ALEXANDRO MELVILLE.

UT POTE gradu tantum a paralyysi apoplexia discrepat, dissertationis plenæ argumentum minus aptum videatur; istas igitur affectiones tanquam diversa ejusdem morbi stadia, aut varietates, habebimus: quia hac ratione historia erit magis per-

A

fecta;

fecta; et morbo veniente occurrenti consilia evi-
dentiora fient.

Apoplexiā strictiūs ita dictam, CULLENUS no-
sologus, modo sequente definit:—

“ Motus voluntarii fere omnes imminuti, cum
“ sopore, plus minus profundo, superstite motu
“ cordis et arteriarum.”

Et sic paralysin:

“ Motus voluntarii nonnulli tantum imminuti,
“ sāpe cum sopore *.”

Cūm autem nulla definitio cuncta morbi phœno-
mena complecti queat, historiam ejusdem pleniores
tradere conabimur.

SECT.

* Vid. CULL. *Synops. Nosolog. Method.* Tom. II. Gen.
XLII et XLIII.

S E C T. I.

De Phænomenis.

HISTORIA medica, ob diversas, quas morbus induit, species, difficultate haud parva premitur: modo enim apoplexiæ, omnibus suis numeris absolute, formâ, impetum derepentè facit; modo autem cum signis paralyseos plus minus generalis et distinctæ nervis tardè obrepit, donec tandem causâ excitante graviore, sed ejusdem generis ac illa, quæ primæ affectioni originem dedit, superveniente, subito ad sumnum inveterationis suæ gradum, perfectam nimirum sensus et motus *voluntarii* imminutionem, vel ad minorem tantum, hemiplegiam scilicet, exurgit.

Posito morbum posteriori forma, hoc est, tardè incipere, varia diversorum stadiorum signa enumere rare aggrediar.

Hebetudo, torpor, et subinde vertigo, nec non capitis dolor modò subitò abortus, modò tardè et paulatim obrepens, sunt inter prima signa, quæ se ostendunt. Somnolentia morbum formidolosiorē haud raro prægreditur: et interdum menses, immo annos, ante paroxysmum perstat.

Cordis et arteriarum actio nonnunquam paululum augetur: et sudores in fronte prorumpunt: tinnitus aurium interdum, et, quod huic affine est, fugax audiendi gravitas, adsunt. Visus quoque sæpe minuitur, vel prorsus, ad tempus, aboletur: alia porro oculi vitia haud raro se ostendunt, unus enim, aut ambo rubescunt: jamque suffusio, aut muscæ volitantes, vel strabismus visus duplicitis phœnomena plus minus exhibens, plerumque adsunt.

Præter hæc multarum aliarum corporis partium, veluti digitorum, &c. paralysis astat: ægerque, inter expurgendum, alterius corporis lateris tor-

porem

porem nonnunquam sentit ; hoc autem levioris potius paroxysmi effectus, quam prodromus habendum videtur *. Loquendi organa pariter afficiuntur ; lingua titubat ; nec verba amplius distinctè esseruntur.

Nec minus lœduntur sensus interni : memoria insignitè minuitur : hujus autem vitii plures sunt varietates, quibus non minus physicos quam *metaphysicos* studere oportet.

Alias memoria longè aliter se habet ; modo enim res ipsæ, ex animo penitus effluunt, dum nominum recordatio intacta manet : hoc celeerrimus GREGORY in prælectionibus suis illustrat ; exemplum narrat insigne mulieris, quæ, licet rerum nomina in memoriam revocare potuerit, se tamen filioli sui matrem fuisse oblita est. Contrà ægrorum exempla non desunt, qui, ut Van. SWIETEN scribit,
“ Non possunt vera rebus designandis vocabula
“ inve-

* GREG. Prælect.

“ invenire ; manibus, pedibus, totius corporis nixu
 “ conabantur explicare miseri quid vellent, nec
 “ poterant tamen.”

Artuum tremores sæpe adsunt ; incubus et insomnia horribilia hujusmodi affectiones comitantur ; sanguis ex naribus sæpe erumpit ; nausea et vomitione non raro adstantibus.

Postquam hæc signa per aliquod tempus plus minus gravia persistent, æger subito, quasi fulmine taetus, apoplexia propriè iic dictâ vel hemephlegia corripitur : hoc quoque interdum, nullis signis antecedentibus evenit :

Ac velut in somnis, oculos ubi languida pressit
 Nocte quies, necquam avidos extendere cursus
 Velle videmur, et in mediis conatibus ægri
 Succidimus ; non lingua valet, non corpore notæ
 Sufficiunt vires, nec vox aut verba sequuntur.

VIRG.

Morbi, sive nullo monito prævio, sive post signo-
 rum

rum seriem supra memoratorum, impetum fecerit, historia est admodum varia: modò enim signa sunt eadem ac illa quæ definitio compleætitur; modò autem concursu et gradu infinitè fere variantur: sopor enim adeo est nonnunquam imo fere semper, profundus, ut sensus externi, licet stimuli validissimi admoveantur, functionibus suis peragendis prorsus impares evadant; ita ut lux et strepitus parum vel nihil valeant; hoc autem non est perpetuum; dantur enim exempla, in quibus ægri vident, audiunt, et tactu percipiunt.

Motus voluntarii, quoque musculi non minus quam organa sensuum afficiuntur; flaccidi et sine sensu existunt, ne quidem *cauterio actuali* excitandi: hic autem mobilitatis defectus gradu multum variat; in nonnullis enim casibus, acribus admotis, solito more carentur.

Spiritus est plerumque difficultis, frequens, abnormis, et sæpe rhoncho concitatur; hoc autem signum maxi-

maximâ ex parte fortuitum est ; minimèque morbi violentiam notat.

Convulsiones sunt sæpe generales ac validæ : interdum verò quasdam tantum corporis partes afficiunt, levesque existunt : ita ut iris sola nonnunquam patiatur.

In quibusdam casibüs alterum corporis latus convulsionibus laborat ; altero simul paralysi affecto.

Arteriarum pulsus sunt admodum varii ; plerumque autem, ineunte morbo, paulatim se submittunt ; nec raro denuo validiores ac frequentiores futuri. Dr SPENS exemplum narrat, in quo pulsus ad 9 usque descenderit * ; qui casus omnium memoriæ proditorum tardissimus est : nonnunquam penitus deficit ; et brevi iterum viget, et supra normam naturalem ascendit ; plerumque est

vali-

* DUNCAN's Medical Commentaries 1793.

validus: modò verò præter naturam debilis existit.

Faciei color est admodum varius, modò purpureus, modò niger Æthiopis vultum refcrens; nec contra desunt multa exempla quibus color erat naturalis. Oculi sunt sape rubri, turgidi, semiaperti, ac vitrei, cum pupillis nonnunquam ampliatis *. Musculi oris, quod non sine magna difficultate aperiri potest, spasmis afficiuntur. Colli ventè turgidae fiunt; et arteriarum carotidum pulsus nonnunquam clare etiam ad insignem distantiam conspici possunt, cuius rei exemplum notabile in hujus urbis noscomio nuper vidi.

Devorandi vis vel minuitur, vel penitus depletur, et lingua paralysi corripitur: urina modò prorsus supprimitur; modò præter voluntatem elabitur; sudor alias tenuis, alias viscidus ac gelidus prorumpit, et lympha aut sanguis ex naribus, ore,

B

auri.

* JUNCKERUS, pag. 900, de Signis Apoplexiæ.

auribus, aliave, qua data porta, via, profunditur.

Morbo funesto evafuro, signa cursum magis itabilem ac fixum legunt: spirandi difficultas magis magisque ingravescit, donec tandem thoracis motus vix percipi potest; arteriarum iectus frequenter ac debiliores fiunt, et demum intermittunt, vel penitus cessant; spuma ex ore fluit: totum corpus gelido sudore difflit, ægerque tandem animam efflat.

Apoplexia autem exquisitor non hoc modo semper infaustè terminatur: frequentius enim in hemiplegiam definit: ægerque vitam miserrimam trahit; donec alter, tertiusve impetus miseriæ finem imponat. Quando hæc morbi forma ægrum adoritur, ponderis in latere affecto, et interdum stuporis, sed raro doloris, sensus, percipitur. Arteriæ initio frequentes plerumque micant; postea autem pulsus minuitur; et interdum, licet

hoc

Hoc admodum raro evenit, penitus ad tempus cef-
sat, brevi iterum excitandus. Alvis plerumque
comprimitur; in quibusdam exemplis sudor vis-
cidus in parte affecta observatur; et nonnun-
quam in totum corpus diffunditur *. Cutis est
sepe aida, et interdum, admodum autem raro,
latus paralysi non affectum convulsionibus corripi-
tur †.

Interea musculi faciei et oris lateris affecti deor-
sum trahuntur; et lingua, quando exscritur, latus
affectum versus pellitur ‡, functionibusque suis pera-
gendi omnino impar evadit. Formicatio molesta
sensum, qui, nervo presso, exoritur, simulans, æ-
grum vexat; et in parte affecta sensus quasi infec-
torum super eandem repentium sepe percipitur.
Tremores quoque ægrum admodum sepe, et direc-

* Hipp. Epid. p. 766.

† Hoff. Syst. Rat. Tom. IV. p. 27.

‡ Greg. Ptoleæt. Clin.

convulsiones agitant *. Et postquam morbus diu perstiterit, partes affectæ macie conficiuntur, et musculi plerumque rigidi fiunt †.

Tactus plus minus afficitur, non tamen penitus aboletur : plerumque autem nullam læsionem insig-nem patitur. Professor GREGORY exemplum narrat philosophorum et medicorum attentione dignum, in quo alterius lateris motus, sensu tactus illæso perstan-te, penitus abolitus erat, dum simul lateris contrarii sensus, mobilitate integra manente, omnino perdi-tus reperiebatur ; adeo ut, stimulantibus lateri pa-ralsysi affecto admotis, nullus sensus excitare-
tur ; iisdem autem partibus ultra medias vertebra-s applicatis, sensus more solito illico cieretur.

Morbus in hoc stadio in mortem interdum des-i-nit : sæpius autem apoplexia iterum iterumque su-pervenit, ægrumque tandem rapit : et etiam in casibus, in quibus morbus hanc proclivitatem in-fau-

* SENAC. de la Structure du Cœur.

† De HAEN de Hemeplegia, p. 31.

faustam non ostendit, paroxysmi reditus semper timendus est ; quia partes vim morbi delectricem semel passæ vigorem pristinum rarissimè recuperant ; et lugenda animi debilitas semper superstet ; " Sic " ut viderim," inquit illustris Van SWIETEN, " sa- " pientissimis antea viris, et fortissimis militibus " masculum illud animi robur adeo suisse encerva- " tum, ut, flebilis pueri instar, ob levissimam cau- " sam in lachrymas solvantur *." "

SECT.

SECT. II.

De Causis Remotis.

HÆ in duas species dividendæ sunt ; in istas nimurum quæ homines obnoxios reddunt, et quæ in jam obnoxiis morbum concitant. Illæ, linguâ medicorum *prædisponentes*, hæ *excitantes* sive *occidentales* dicuntur.

De Prædisponentibus.

NATURAM certam ac definitam sanguinis copiam cursu æquabile et constante ad cerebrum mittere, non solum ex figura et structura cranii foramen per quæ vasa sanguinem vehentia transeunt, sed etiam ex vasorum ipsorum cranium jam ingreforum fabrica, et cursu sinuoso, et commercio, sum-

ma cura voluisse patet. Ex hac miranda fabrica hunc aquabilem sanguinis cursum ac copiam consilio cuidam utilissimo in œconomia animalium inservire colligere fas est: necnon sensorii functiones, et diversos machinæ motus ex eodem artificio magna ex parte pendere, nobis verisimile videtur.

Quando causæ agunt quæ cursum sanguinis abnormem caput versus faciunt, morbus, interdum, frustra repugnante naturâ, concitatur: quædam enim corporis conditiones, vel ex fabrica congenita, vel ex vitio, progreidente vitâ, collecto, naturæ coniilio haud parum adversantur; et sic corpus morbo multo opportunius, quam solitis rebus circumstantibus, reddunt. Hæ corporis conditiones sunt præsertim, ætas ingravescens; caput magnum; collum breve; obesitas; nimia corporis plenitudo; et ebrietas frequens. Harum rationem nunc ordine reddere conabor:

Ætas ingravescens.—Malum de quo agitur primam

iam raro adoritur aetatem; plerumque enim tempore quod annum quadragesimum inter et sumam senectutem labitur, occidere solet: quamvisque res nonnunquam aliter se habuerit, hoc tamen nihil de lege generali derogatus est ab invicem subiectis aliis. Namque aetate rursumq; etiv sint. Quare aetas proiecta huic malo prae juniore, opportuna existit, ex periculis Doctoris WINTRENGHAM, me saltem judice, exponi potest: ex his enim arterias, si venis componantur, majorem, progrediente vita, rigiditatem acquirere constat; hinc sanguis solito majore copia in venas propellitur: et haec distenduntur, et tonum majorem arteriarum rigiditati aequandae parem adipiscuntur: si autem ultra modum distendantur, tantum aberit, ut vires, pro rata distensione, maiores adipiscantur, ut etiam ceterarum partium musculosarum instar, insigniter praeter naturam infirmentur; et distensione adhuc maiore adhibitâ, paralysi demum afficiantur; qui quidem effectus in omnibus partibus muscularis, VETERINE ARS. antiquam singuliter videtur ultra

ultra modum distentis, ex quadam œconomiæ animalis lege in universum oriuntur.

Et sane venas in ætate provectionis sumnum propemodum tonum ob distentionem, quam, progrediente vitâ patiuntur, adipisci verisimile vedebitur: hinc si cordis et arteriarum actio ex quavis causa augeatur, venæ ulterius distendentur: et tonum suum partim amittent, ita ut sanguinis cursus per easdem impeditus, aut saltem tardatus, redditui ejusdem in arterias faveat; et hinc apoplexiæ impetum facile concitet; eoque facilius hunc effectum edat, quod capitis, præ cæterarum corporis partium arteriæ, in ætate provectionis rigidæ, ac fragiles, existunt.

Caput magnum haud parum huic morbo favere nemo sanus negaverit: et licet variæ expositiones elaboratae et tanquam elucubratæ a variis auctoribus prolatæ fuerint, rei tamen pathologiu atrâ adhuc caligine mergitur: VAN SWIETEN

caput magnum necessarium colli brevioris effectum opinatur; et hinc, ipso judice, ratio facile redditur, quare caput magnum homines apoplexiæ opportunos reddit: hæc autem rei endatio minime, ut mihi videtur, admittenda est: sæpe enim colla longa capitibus magnis instructa videmus. Hunc nodum, non sine magna difficultia sequenti ratione solvere audemus.

Sanguinis circuitus intra cranium, situ corporis erecto, alii paret naturæ legi, præter has, quibus in cæteris corporis partibus absolvitur, ponderi nimirum aëris atmospherici arterias carotides extra cranium, non autem intra prementis: hoc posito, cùm venæ sunt arteriis longiores: ex principiis hydraulicis easdem, ad sanguinem per partes cranii internas, situ corporis erecto, nulla vi cordis aut arteriarum adjuvante, vehendum valere manifestum est.

Cùm autem hæc vis, tandem erecto corporis situ, sanguini reducendo inservit, neque impul-

sum necessarium impertit; causas, quæ sanguinis cursum in cæteris corporis partibus absolvunt eidem superadditas invenimus: hoc autem de arteriis solis verum est: venæ enim tuborum metallicorum instar, actioni inhabiles existunt: sanguis igitur per easdem partim vi *hydraulica* supra memorata, et partim vi a tergo vehatur oportet: et hinc patet, quo longior est circuitus venarum, eo majore arteriarum vi opus esse ad sanguinem cum justo impetu per sinus propellandum. Multae autem res in capite præter naturam magno reddunt vim, quam arteriæ sanguini impertunt, minorem renixu, quem venæ et sinus eidem opponunt: ob majorem enim arteriarum longitudinem in capitibus magnis, vis quam cor dat, magis subigetur, antequam sanguis ad venarum initia pervenerit; hincque vis a tergo in capite præter naturam magno erit præter solitum parva: quamvis ob majorem sinuum longitudinem, et præsertim ob curvaturas eorundem maiores, majori arteriarum vi opus est, quam in ex-

emplis ordinariis. Hic igitur renixus, quem major finum longitudo, et curvaturæ eorundem profundiores vi a tergo opponunt, redditus sanguinis arterias versus favebit, quod harum actionem augebit; et rebus circumstantibus secundis, effusionem efficiet: quanam vero ratione hæc apoplexiam excitat, exponemus, ubi de causa proxima agetur.

Collum breve.---Vis circuitus sanguinis in partibus prope cor sitis est major quam in remotoribus: hinc manifestum est, quibus collum est brevius, iis cerebrum, vi sanguinis circuitus auctâ, multo magis præter solitum pressum iri, quam his, qui collo longiori instructi sunt: illisque apoplexiā, aut paralyſin, causa excitante agentē, facile concitari posse, dum hi eisdem rebus circumstantibus, ab his malis immunes evaderent.

Obesitas.---HIPPOCRATES ipse graciles diutius, niquam obesos vivere observavit; multi quidem enumerari

merari possent morbi, qui obesitatem causam suam agnoscunt: nulli autem, qui originem suam ex gracili ac macilento corporis habitu ducunt.

Textus cellulosus cutem inter et musculos, et omentum, sunt precipue adipis sedes; qui evidentur efficit, ut sanguis interiores corporis partes, cerebrum nimirum, pulmonem, ceteraque viscera versus pellatur; vasa enim quæ per telam cellulosam transeunt, adipe premantur oportet; hinc sanguinis per eandem transitus difficilior fit; et halitus cuticularis suppressio, et abnormalis sanguinis distributio interiora versus subsequentur.

Porro tota tela cellulosa adipe distenta, et omentum omnia vasa vicina compriment; et hoc modo ad eundem effectum præstandum haud parum conferent. Quanam ratione internarum partium plenitudo proclivitatem in apoplexiā facit, satis jam patet.

Nimia corporis plenitudo.---Hæc inter causas prædisponentes primum fere locum tenet: præcipue

cipue hujus vitii causæ sunt exinanitionum solitarum suppressio; hæmorrhagiæ sive sponte, sive arte fiant; ignarum vitæ genus; et diæta plenior.

Ratio, qua pleræque harum caufarum corporis plenitudinem efficiunt, adeo manifesta est, ut nulla expositione indigeat. Hæmorrhagiæ plenitudini, vires arteriarum extremarum minuendo favere videntur: his enim magna sanguinis jacturâ debilibus, excretiones omnes languide perficiuntur; hinc egesta pro rata parte minora fiunt; et nimia humorum copia brevi congeretur.

Ebrietas frequens ultima harum caufarum, duplice ratione agere videtur: vim enim cordis et arteriarum ultra modum auget; et inordinatum sanguinis cursum saepius caput versus faciendo, vasa proclivitatem ad actionem istam inordinatam præter naturam acquirunt, quod hominem apoplexiae, caufis occasionalibus, etiam levibus admotis, obnoxiam reddit.

De Occasionalibus.

MORBUS nonnunquam adeo derepente impetum facit, et res circumstantes sunt adeo obscuræ, ut nulla causa occasionalis percipi possit; interdum vero hæ causæ satis manifestæ fiunt. Et precipuæ esse videntur exercitatio corporis vehemens; tussis et sternutatio; animi affectiones; calor externus; balneum calidum; ebrietas; crapula; quivis corporis situs, qui cursui sanguinis per arterias in caput favet, redditumve ejusdem per venas impedit; ligaturæ circa collum; cervix subito, vel diu rotata; cœli temperies et varietaes; et polypi circa cor; de quibus paucula ordine jam dicemus.

Exercitatio corporis vehemens.---Justa musculorum actio sanguinis circuitui necessaria est, vehementior autem sanguinem solito majore vi et copia ad partes corporis interiores, qua quippe sanguis

guinis impetui minus resistitur, impellit. Hoc docet pallor qui musculo se contrahenti semper supervenit; quod manifestè pendet ex sanguinis quantitate, quam musculus amifit, quæque necesse est ad partes internas utpote minus renitentes defertur; cumque cerebrum cranio defensum, omnium partium, pressurâ maxime immune exiftit; sanguis ibidem facilius quam alibi corporis accumulabitur: præterea pressus quem ipsi arteriarum trunci, musculis, inter contrahendum, tumentibus, patiuntur, haud parum ad hunc effectum edendum confert. Porro in omniniſu corporis vehementiori inspiratio plena ac profunda semper fit, quæ non ſolum ſanguinis reditum a capite impedit, ſed etiam eundem per arterias carotides insigni vi ad cerebrum mittit: ob pressum distentus, venis ſanguinem ex eodem reducentibus infert, ſanguis insigni velocitate in auriculam cordis finistram feratur: nec defunt exempla hominum quibus ex hac cauſa ſanguis ex fa-

ciei vasculis prorupit, et similis sanguinis fluxus in vasis internis, similisque arteriarum ruptura facile concipi possunt. Ad hoc caput referri possunt omnes pulmones nisus, sive hi loquela vehementiore, cantu, aut instrumentorum musicorum inflatu fiant. Vis insignis quâ cantus ad hunc morbum concitandum valet, exemplum nobis VAN SWIETEN tradidit. Celeberrima cantatrix VINDOBONAE quoties tonos quosdam canere conaretur, vertigine corripiebatur, facies turgescebat, et rubore suffundebatur : hincque suum vitæ institutum relinquere coacta fuit.*

Tussis et Sternutatio.---Hæ violentiores corporis agitationes haud raro apoplexiā concitarent: tussi vehementiore facies statim rubore suffunditur, sanguinisque motus præter solitum intenditur; quod omnes fere norunt. Eruditus GREGORY exemplum in suis prælectionibus nar-

D

rat,

* Comment. Aph. 1010. 38.

rat, quod huic rei plus luminis, quam quodvis ratiocinium offundit puerο, qui pertussi laborabat, sanguinis fluxus caput versus tantus existebat, ut oculi ob sanguinis in tunica adnata congestionem lignum quod Anglice *Mahogany* nuncupatur, colore referrent. Risus vel fletus eundem effectum interdum edere potuerint.

Animi affectiones.---Animi motus, qui huic effectui præstanto pares inveniuntur, sunt præser-tim illi qui excitantes appellantur ; inter hos præcipue eminet ira, quæ in signi quidem actionis cordis et arteriarum et precipue capitis vasorum excitandæ vi pollet : excandescenti facies rubore iræ indice subito suffunditur ; consimilis sanguinis impetus in vasis cerebri oboriens apoplexiæ, ut facile concipi potest, haud raro ansam præbebit : nervorum insuper distentio sæpe ex abnormi hoc animi effectu exoritur ; quod insigniter docet quantum vi ira in sensorio et nervis pollet.

Calor

Calor externus.---Vix hic loci memorare opus est quanta vi calor in totum genus vasculorum agit, quamque facile hunc morbum excitat, præfer-
tim si cum aëre corrupto, ubi plures simul con-
gregantur, conjugatur: ante focum luculen-
tum sedentibus satus minori apoplexiæ similis
obrepit; nec etiam optima sanitate utentes huic
causæ objecti languore ac somnolentia immunes
evaferint.

Balneum tepidum.---Hujus effectus partim ex caloris stimulo, ut supra jam exposuimus, et partim ex toto genere nervoso laxato, aut soluto, pendent: nec defunt exempla hydropicorum, qui tepidario immersi apoplexiâ correpti subito corruerunt.

Ebrietas.----Hanc causis apoplexiæ prædis-
ponentibus supra jam annumeravimus; nec eadem rarius causa morbi excitans existit: et sa-
ne ebrietas ipsa est corporis et animi status apo-
plexiæ

plexiæ haud absimilis; nec utriusque conditio-
nis causæ aliter quam gradu solo discrepare mihi
videtur: aucta vasorum sanguinem ad cere-
brum vehentium actio ex faciei rubore et pleni-
tudinis in capite sensu manifeste patet: et hæc
apoplexiæ varietas potius ex pressu, quem aucta
vasorum actio cerebro infert, quam ex effusione
pendere videtur.

Crapula.---Nulla causa cognoscitur, quæ apo-
plexiam sæpius quam crapula excitat.

“Ense cadunt multi, perimit sed crapula plures,
“Hinc subitæ mortes, atque intestata senectus.”

Nec hoc satyricum fagacis HOGARTH peniculum
fugere potuit. Hujus effectus, pariter ac somno-
lentiæ, quæ ingurgitationi supervenit, nonnulli ra-
tionem ex ventriculo ultra modum distento aor-
tam comprimente petere solent: parum autem e-
videns est, talem effectum hac ratione fieri posse,

ni

ni ventriculus immanè distendatur; eadem quippe somnolentia animalibus, quæ nullam habent aortam post cibum copiose sumptum obrepit; ex pressura igitur aortæ illata, vix, aut ne vix quidem, pendere potest.

Quivis corporis situs, qui cursui sanguinis per arterias in caput favet, redditumve ejusdem per venas impedit.---His causis annumerari debent corporis inclinatio, et decubitus cum capite præter solitum humili; tantus est primæ harum causarum effectus, ut nonnullis inter corpus inclinandum memoria penitus deficiat: talium autem situum effectus ex consuetudine plurimum pendent.

Ligaturæ circa collum.---Hæ venas plus quam arterias, propter illarum situm compriment, quod sanguinis cursum arterias versus repellendo morbum nonnunquam concitaverit.

Cervix subito, vel diu rotata.---Hæc res a Doctore FOTHERGILL memorata quibusdam argutiola forsan videbitur: minime tamen negligenda est: quo brevior fuerit ægri cervix eo major erit effectus: venæ enim jugulares breviores majorem distentionem quam longiores capit is rotatione patiuntur.

Cæli tempesties et varietas---Hæc affectio quibusdam annis, et tempestatibus, præ cæteris adeo frequens existit; ut a quibusdam pro morbo per populum graffante habita fuerit. Hoc cæli temperiei subito, veluti ex frigida in calidam, mutatæ tribuendum videtur: hinc morbus frequentius vere, quam quavis alia anni tempestate se offendit. Systemate vasculofo exquisitus librato, sanguinis destributio abnormis stimulo caloris externi caput versus fieri potest: et hoc modo morbus ex hac causa oritur verisimile est.

Polypi circa cor.---Quamvis pleræque harum concretionum, quæ tam sæpe in corde partibusque eidem vicinis reperiuntur, post mortem formantur; nonnunquam tamen in corpore vi-vo existunt, variisque, non solum capitum, sed etiam aliarum corporis partium morbis et præsertim apoplexiæ, vel hemiplegiæ ausam facile præbent.

SECT.

SECT. III.

De Causa Proxima.

QUAEDAM sensorii et nervorum conditio, qua vires eorundem actuosæ vel multum imminuuntur vel prorsus abolentur, hujus morbi causa proxima habenda est.

Hæc morbosa conditio dupli, ut mihi videtur ratione effici potest; scilicet,

1mo, Pressu præter naturam cerebro, aut nervis illato.

2do, Viribus sedantibus corpori admotis.

Pressuram cerebro illatam, causam morbo concitando parem existere probatur, animum advertendo

tendo ad cerebri conditionem cranii fracturâ inductam. Illustris BOERHAVIUS insigne nobis exemplum tradit quod hanc rem clarissime demonstrat.*

Homini vivo pars cranii sublata fuit, ita ut dura mater in conspectum venerit : pressurâ levi huic duræ matris parti admotâ, tinnitus aurium et scintillas oculis obvolitantes æger cum vertigine percipiebat ; pressurâ majore adhibitâ, obdormiscebat ; et pressu magis adhuc aucto, clarè sterterebat : hinc dubitari non potest, quin pressura causa corporis conditione, de qua hic agitur, inducendæ par existat.

Cerebri pressura apoplexiā vel hemiplegiani efficiens ad quatuor fontes referri potest, hi sunt.

imo, Vis externa cranii partem deprimens.

E

* Prælect. vol. ii. p. 659.

2do, Tumores intra cranium generati.

3to, Vis sanguinis cerebri vasa distendens.

4to, Sanguinis aut feri effusio intra cranium.

De duabus posterioribus causis tantum agemus; duæ enim priores chirurgo concredendæ sunt.

De modo, quo hæ causæ morbum proximè excitant, varie inter varios pathologos disputatum est.

Creditum est, et adhuc creditur, fluida in cerebri ventriculos, vel alias cerebri partes, effusa, in primo casu, et vim sanguinis vasa distendentem in secundo, morbum concitare, cerebrum comprimendo, hoc est, in spatium minus evidenter coarctando; et quod hinc consequens est, vasa ipsa, haud amplius solito more sustentata, distendi-

Cele-

Celeberrimus autem Professor MONRO negat cerebrum, durante vitâ ita comprimi posse, ut spatum minus manifestè occupet; vir enim sagax experimento simplice de industria ad hanc litem dirimendam facto, cerebrum in spatum minus coarctatum non demonstrari posse, invenit.

Cerebri ovilli portionem infra aquam excisam ampullæ vitræ aquâ prope modum plenæ, eodem loci sitæ indidit; et in ampullæ cervice locum ad quem aqua assurgebat adamante notavit: deinde vasis collo vesicam aëre distentam firmiter affixit; quo facto, vesicam insigni vi compressit; nec tamen aqua vel minimum quidem depresso fuit.

Hoc experimentum, ut opinor, extra omnem dubitationem probat, cerebri substantiam nulla vi cordis et arteriarum actione illatâ ita comprimi posse, ut spatum evidenter minus occupet.

Hinc sequitur sanguinis quantitatem in capite existentem augeri non posse, ita ut incrementum sensibus nostris percepi possit, quamdiu cerebri substantia integra, et crani parietes in statu naturali persistenter, copia licet sanguinis major, quovis dato tempore, ob majorem vasorum actionem per idem transeat.

Apoplexia igitur pendere non potest ex compressione cerebri molem evidenter imminguente: cum autem morbum ex pressu cerebro illato ori pro certo constat; laticem in ventriculos vel alias cerebri partes effusum, et vasorum conditionem nullo alio operandi modo evidenti morbum inducere concludamus oportet.

2do, Causa apoplexiæ proxima viribus sedantibus corpori admotis induci potest.

Hujusmodi causæ sunt vapores *hydrargyri*, plumbum, aliaque venena metallica; opium, al-

cohol

cohol et multa alia *narcotia*: gas acidum *carbonicum*, aliisque vapores *mephitici*: quibus annumerari possunt vires frigoris sedantes, cerebri concussio, ictus electrici, et quidam animi affectus: et inter has pathemata deprimentia, quorum nonnulla morbum recte inducunt.

Has, et hujusmodi causas, apoplexiā concitare minime dubitari potest; quali autem modo in cerebrum, et nervos, agant, qualesve sint mutationes, quæ efficiuntur, ignorare me fateor.

S E C T.

SECT. IV.

De Morbi Ratione Medendi.

CURATIO ex jam dictis in tria consilia quasi sponte se dividit.

I. MORBO VENIENTI OCCURRERE.

II. PAROXYSMUM PRAESENTEM TOLLERE.

III. HEMIPLEGIAM, QUAE CONSEQUITUR, AMO-
VERE.

PRIMUM CONSILIJU M absolvitur vitando causas
excitantes, ex quibus periculum præcipue et
proxime pendet; et corrigendo proclivitatem,
quatenus hoc sociatis regiminis et medicamento-
rum viribus fieri potest. Horum usus violentia
signorum, aegri ætate, corporis habitu, et varia
con-

consuetudine, gubernari, ac moderari, debet : cùmque vasorum cerebri plenitudo sit causa prædisponens, ex qua paroxysmus instans præcipue pendet, ad illam tollendam totis viribus incumbere debemus; varia suppetunt remedia, quibus hic finis absolvitur ; præcipua sunt sanguinis detractio ; medicamenta cathartica ; fetacea et fonticuli ; tonsura capitis ; errhina ; dieta ; et exercitatio ; de quibus paucis sigillatim agemus.

Quamvis nullum sit remedium præsentius aut efficacius ad plenitudinem tollendam quam detractio sanguinis, cum tamen corpus solvit, laxat, et idem malo opportunius reddit pessima ex eiusdem usu timenda, nec unquam in casibus ordinariis adhibendam censemus : in exemplis autem gravioribus, quibus paroxysmus instat, est certe auxilium, cui soli confidere possumus, cù jusque usu tempestivo maximæ aegrotanti sanitatem recuperandi fortes crunt. In exemplis ubi de sanguine detrahendo ancipites hæremus,

hirudines

hirudines temporibus admotae, vel occipitis sca-
rificationes consilio quam optime responde-
bunt.

Cùm alvi purgatio peculiari in sanguinis cur-
su a capite avertendo vi pollet, eandem fini
nostro bene accommodatam putamus: acriora
autem cathartica nunquam nisi in gravioribus
exemplis danda sunt; quia sanguinis cursum
nimis festinando plus damni interdum quam
boni afferre possunt: mitiora igitur, qualia sunt
pulvis jalappæ compositus, et potassa tartariza-
ta anteponenda sensemus; hujusmodi mitiora,
semel septimanâ data, menses, vel etiam annos,
præscribi possunt.

Setacea et fonticuli ad generalem corporis ple-
nitudinem minuendam plurimum prodeesse pos-
sunt; Et posteriori colli parti, si optio nostra fue-
rit, indenda suaderemus; Professor GREGORY
exemplum tradit hominis, qui magno hujusmo-

di fonte pisi ope copiose manente, dieta parca, et alvi purgatione, apoplexiæ impetu per plures annos immunis evaferat.

Tonsura capitis, præsertim si caput simul frigida sæpius lavetur, haud aspernandâ in paroxysmo arcendo vi pollet.

Errhina semper, ni aeger antea eis assuetus fuerit, vitari debent: et hic etiam, caute præscribenda sunt: copiaque paulatim minuenda est, donec tandem sine periculo penitus subduci queant. Sunt qui eadem, ob copiosam muci excretionem, quam efficiunt, capitis vasorum plenitudinem minuere contendunt: quantum autem hac ratione profundunt, tantundem sanguinis cursum caput versus per stimulum suum faciendo, obsunt.

Porro alia suppetunt auxilia, quibus teste experientia, paroxysmus certius arceri potest; hæc

E sunt

funt diæta parca, et exercitatio idonea peritè ordinatae.

Diaeta omnigena nimis stimulans, quales sunt carnes, quæ per se faciem rubore suffundunt, condimenta, butyrum &c. caute vitanda est; et hujusmodi rerum stimulantium vice, cibus ex frugibus mitioribus paratus concedi debet. Abstinendum est quoque ab omnibus potionibus mætracioribus, vino nimirum, et liquoribus spirutuosis, ac fortioribus fermentatis. In omnibus autem casibus cerevicia tenuis, quippe quæ alvum leniter laxat permitti debet, et aquæ anteponenda videtur.

Hæ tamen regulæ aetate proiectis et vieti pleniori assuetis minus rigidè præcipiendæ sunt; hi enim aegri stimuli soliti imminutionem non sine molestia, vel etiam periculo ferre valent: in hujusmodi igitur casibus, cibus præfertim ex carnisbus tantum minuendus est: coenæque ex his paratæ

ratæ penitus prohibendæ sunt. Porro si potioribus mercioribus quotidie assueti fuerint, pauxillum ipsis concedi debet.

Exercitatio licet omnium remediorum in hoc morbi stadio longe optimum, si tamen nimia fuerit, et præsertim si aegrotans obesior, vel aetate provectionior sit, haud raro causa morbi exercitans fieri solet; ut supra exposuimus; istiusmodi igitur aegrīs cautissime administranda est: exercitatio debet esse ea, quæ halitui cuticulari sustenendo par existit; nec unquam tanta esse debet, ut respirationem acceleret, aut corporis calorem intendat.

Si aegri ad ambulationem non valent, gesatio primo in rhedâ, et postea, quando plus virium habebunt in equo sedulo usurpanda est: nec raro post hoc ambulationi pares evadent. Exercitatio lenis, crebra tamen esse debet, et satis diu adhibita; hoc enim modo sanguinis cursus ad corporis

corporis superficiem dirigitur; et plenitudo occurritur.

Una cum his auxiliis justus frigoris gradus proderit: aegerque capite solito altiore dormire debet.

II. PAROXYSMUM PRÆSENTEM TOLERE.

Paroxysmo astante, aegro vestes statim exuendæ sunt; et fenestræ &c. apertis in aëre frigido, et situ erecto, collocari debet; interea cavendum ne hominum turba, quippe quæ aërem corruptit, et calefacit, circa aegrum congregetur; quo facto, varia auxilia ad pressuram cerebro illatam, sanguinis nimirum detractio, medicamenta cathartica, emetica, et exulcerantia, statim adhibenda sunt.

Sanguinis detractio in omni apoplexiæ, vel hemiplegiæ exemplo, quod ex hydropisi, vel ex potentiis sedantibus non evidenter pendet, sta-

tim usurpanda est : et consuetudo fuit sanguinem
mittere ex venis jugularibus, vel si hoc frustra
tentatur, ex arteriis temporalibus, vel denique, si
haec pertundi non possunt, quævis corporis vena
statim incidi debet. Haec exinanitio, corpore e-
recllo, quippe quod consilium nostrum manifeste
adjuvabit, perficienda est : sanguisque prima vice,
ad uncias sexdecim, vel viginti mittatur oportet.

Interea detrac^tio sanguinis topica minime ne-
gligenda est ; haec vel hirudinibus occipiti admo-
tis, vel scarificatione, vel denique cucurbitulis
cum ferro fieri potest ; haec autem, quippe qua
sanguis citius detrahitur, anteponenda est. Non-
nulli, uno corporis latere gravius affecto, sanguinis
ex latere contrario detractionem plus profuturam
crediderunt. Omnibus his modis sanguinis de-
trac^tio non solum generalem corporis plenitudi-
nem, sed etiam, quod hinc consequens est, impe-
tum ejusdem cerebrum versus statim imminuet.

Alvi purgatio semper cum sanguinis detractio-
ne conjungi debet : et eandem inter prima re-
media huic malo accommodata existere, ex ante-
a expositis facile constabit : si devorandi vis su-
perficit, cathartica ore dari oportent: sin minus, e-
nemata acria injicienda sunt.

Vomitio præterquam in casibus, qui ex nimia
ventriculi distensione pendent, nunquam, astan-
te paroxysmo, permitti debet: quia, vomendi
actione facies non solum plenis tumescit, et rubore
suffunditur; sed etiam oculi lacrymas effundunt,
et sanguine turgidi fiunt, et scintillæ sæpe ipsis ob-
volitant; aegerque ob sanguinis impetum in ce-
rebro auctum vertigine corripitur: et respira-
tione per vomendi actionem impedita, latus cor-
dis dextrum se facile deplere non yalet: et hinc
venæ, quæ sanguinem ex capite reducunt, tur-
gefunt. Medicamenta exulceratoria cum maximo com-
modo,

modo, præsertim partibus capiti vicinis, posteriori nimirum colli parti, vel pone aures imponi possunt; cursum sanguinis a partibus internis ad externas faciendo prodesse videntur.

Si morbus ex diathesi hydropica oriatur, medicamentis catharticis, et exulceratoriis, optime tractabitur.

Si apoplexiæ insultus potestates sedantes cañam agnoscat, morbus principiis diversis ab his de quibus supra egimus, curandus est.

Quando venenum, quod morbum excitat, recens in ventriculum recipitur, vomitum interdum cito efficiet: hic vomitus promoveri debet; quando autem venenum vomitionem non ciet, vomitoria, quæ subito operantur, Zinci nimirum *sulphas*, &c. statim adhibenda sunt. Contra autem, si venenadiu in ventriculo, nulla vomitione excita, permanferint; nihil commodi ex emeticorum usu percipi potest:

potest: cùmque nulla sit ratio, eur cerebrum in hū-
jusmodi exemplis, sanguinis circuitu p̄m̄ti cre-
damus; hoc tantum dām̄tendū ut ægeraere
frigido, aliquo stimulantibus, quorum præci-
puum videtur frigida, faciei aliive corporis parti,
effusa, excitetur.

metabœ al in dñe, ngl̄i oal nrigi vibrau⁹
- III. HEMIPLEGIAM, QUÆ CONSEQUITUR, AMO-
VERE. Iuicq̄ studiis suorum sumq̄ autq̄ autm̄
cito translatissq̄. Iuicq̄ studiis

Si paroxysmus hemiplegiæ formâ adoritur, me-
dendi ratio, ideo quod causæ sunt eadem ac in a-
poplexia idiopathica, prorsus eadem fit oportet:
et quando hemiplegia apoplexiæ supervenit, est
cur celebri pressuram in aliquid tempus postea
supereffe credamus. Hoc clarius patebit ex CUL-
LENI verbis, ubi dicit, “ Where a fit of apo-
plexy has gone off, and there appears a state of
“ palsey appearing as a partial affection only, it
“ might perhaps be supposed that the origin of
“ the nerves is in a great measure relieved; but
“ the palsey is liable to return if the cause
in

" in so far as commonly there still remain the
" symptoms of the loss of memory, and of some de-
" gree of fatuity, these, I think, shew that the or-
" gan of intellect, or the common origin of the
" nerves, is still considerably affected."*

Quamdiu igitur hæc signa perstant in eadem
medendi ratione, quam in apoplexia commendava-
vimus, plus minus strenue adhibitâ prout signa
postulaverint, perstandum erit.

Ratio autem medendi omnino diversa fit oportet;

imo, Quando morbus in tempus insigne protra-
hitur,

2do, Cùm signa cerebri pressuram indicantia, tol-
lantur.

33^o, Quando malum ex sedentibus oriri cognoscetur.

In hujusmodi enim exemplis pressuram cerebro sublatam ponimus; dum læsio sola perstat: quod optime illustratur tali cuiusvis nervi pressurâ, qualis dotes ejusdem naturales non perduntur, enim in parte, in quam nervus diffunditur, torpor sentitur, qui quamdiu pressura adhibetur, augeri perstat: hic autem effectus, pressura sublata, non tollitur, sed paulatim minuitur, donec partes tandem ad functiones naturales restituuntur. In istiusmodi igitur casibus remedia, quæ commendari solent, sunt stimulantia, eaque præfertim, quæ in systema nervosum solum agunt. Cùm autem morbi ad redeundum proclivitas semper plus minus præceps sit, ad hanc, inter stimulantia danda, animus sedulo adverti debet. Haec stimulantia sunt vel interna vel externa.

34^o, Quod est stimulans inter omnia.

35^o, Stimulans in deinceps obsecrandi vel Externa

Externa.—Magna horum varietas commendata fuit: sequentia autem præcipua videntur: aqua nimirum *ammonie* causticæ oleis conjuncta: hujusmodi præparata, partes quibus admoventur, insigniter calefaciunt; *ammonia* pariter erhitnum præscribi potest. Horum autem medicamentorum princeps est sinapi, eidemque maxime fidendum est; cavendum autem ne partes exulceret. His conjungi possunt cantharides, ita tamen ut cuticula in vesiculos non turgeat: spiritus vinosus *camphoratus*; urticarum punctio; frictio vel strigli, vel pannæ laneo; et calor.

Quando morbus ex viribus sedantibus oritur, frigus frigidarii forma præscribi debet: hoc autem in tempus breve tantum, ususque ejus effectionibus, quos ederit, gubernandus est.

Aura electrica apud quosdam in pretio habetur: hujus autem usus admodum anceps videtur, vasa enim stimulando morbum reducere potest.

Exercitatio tamenque nunquam uomitti debet;
namque veluti fama, aegrotus hoc malo labo-
rans. *Mobilitate viget, viresque acquirit eundo.***
Cæterisque omnibus longè gestatio eminent;
non solum quia aeger viribus propriis se exercere
nequit; sed etiam quia stimulus virium quæ in
gestatione exercentur, mediocris, et idecirco
tutus, existit.

Præter haec autem animus ad partem affectionis
nunquam non adverti debet; hæc saepius
movenda est: si aegrotans ad hunc motum non
valet; nihilo tamen minus moliendum est: qui-
a nullus licet motus sequatur; actio tamen vo-
luntatis inter stimulos efficacissimos, et maxime
naturales, qui adhiberi possunt, existit.

Interna.---*Carbonas ammoniae* dari folet; hu-
jus autem medicamenti effectus plerumque pa-
rum efficax comperietur. Fruges ex classe Te-
tradynamiâ

* Virg.

tradynāmī à plurā medicamenta stimulantia interna, quæ cum felici interdum excitu dantur nobis suppeditant, et hujus classis instar omnium sunt finapis semina integra data. Varia aromata commendata fuerunt: cùm haec autem insigni in stystemate vasculoſo vi agunt, omittenda videntur. *Guajacum*, *terebenthina*, variaque medicamenta foetida subinde data fuerunt, his autem fidere nolumus. *Cinchona officinalis* et ferum eodem consilio, sed frustra, administrata fuerunt.

Denique quod omnium horum stimulantium internorum usum attinet, eundem semper suspicuum habere debemus: summa semper prudenter danda sunt: incaute enim adhibita tantum abest ut prōfint, ut morbum nonnunquam concident.

F I N I S

C O R R I G E N D A.

- Pag. 2. lin. 1. *pro* veniente *lege* venienti.
6. — 10. *pro* hemephlegia *lege* hemiplegia.
— — 14. *pro* necquam *lege* nequicquam.
7. — 12. *dele* (,)
— — 19. *pro* concitatur *lege* comitatur.
8. — 14. *pro* descenderit *lege* descenderat.
12. — 12. *post* ralysi *adde* haud.
16. — 3. *pro* occidere *lege* accidere.
18. --- 19. *pro* tandem *lege* tantum.
21. --- 7. *pro* ceteraque *lege* cæteraque.
22. --- 3. *pro* ignarum *lege* ignavum.
--- --- 19. *pro* obnoxiam *lege* obnoxium.
25. --- 14. *pro* concitarent *lege* concitarunt.
26. --- 2. *pro* offundit puero *lege* offundit ; puero.
30. --- 8 et 11. *pro* cæli *lege* coeli.
36. — 5. *pro* perstiterent *lege* perstiterint.
40. --- 12. *pro* sensimus *lege* censemus.
41. --- 1. *pro* manente *lege* manante.
--- --- -- *pro* dieta *lege* diæta.
46. — 5. *pro* oportent *lege* debent.
47. --- 17. *pro* excita *lege* excitata.
48. --- 6. *pro* effusa *lege* affusa.

